

21 fevral 2025-ci il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

**LİNEKS FORTE** bərk kapsullar  
LINEX FORTE

### Tərkibi

**Təsiredici maddə:** 1 kapsulda 60 mq canlı liofilizə olunmuş süd turşusu bakteriyaları vardır:  
1 x 10<sup>9</sup> KƏV-dən (koloniya əmələgətirici vahid) az olmayaraq *Lactobacillus acidophilus*;  
1 x 10<sup>9</sup> KƏV-dən az olmayaraq *Bifidobacterium animalis subsp. Lactis*.

**Köməkçi maddələr:** inulin və oliqofruktoza (qlükoza, fruktoza, saxaroza), maqnezium stearat, maltodekstrin.

**Örtük:** hidrokispropilmetilsellüloza, titan dioksid (E171), sarı dəmir oksidi (E172).

### Təsviri

Gövdəsi ağ, qapağı sari rəngli kapsullardır.  
Kapsulun möhtəviyyatı açıq-bej rəngdən açıq-çəhrayı rəngə qədər dəyişə bilən, içində daha tünd çalarlı xalları olan tozdur.

### Farmakoterapevtik qrupu

Diareyaəleyhinə təsirə malik mikroorqanizmlər, süd turşusu bakteriyaları.  
**ATC kodu:** A07FA01.

### Farmakoloji xüsusiyyətləri

#### **Farmakodinamikası**

Lineks Forte-nin tərkibində insan normal bağırsağ mikroflorasının bir hissəsi olan *Lactobacillus acidophilus* və *Bifidobacterium animalis subsp. lactis* bakteriyaları var. Onlar ştammları bir neçə mexanizmlər vasitəsilə profilaktik və terapevtik təsirlər göstərir. Onlar patogen bakteriyaların inkişafının qarşısını alır:

- bağırsaqda pH-ı azaltmaqla (*Lactobacillus acidophilus* süd turşusu istehsal etməsi, *Bifidobacterium animalis subsp. lactis* süd turşusundan əlavə həmçinin sirkə və kəhraba turşusu istehsal etməsi nəticəsində),
- patogen bakteriyalara toksiki təsir edən metabolitlər istehsal etməklə (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> yaranması),
- mikrobəleyhinə substansiya, bakteriosinlər istehsal etməklə (*Lactobacillus acidophilus* geniş spektrli bakteriosin olan asidosin ifraz edir ki, bu isə bakteriyaların (həmçinin *Helicobacter pylori*) və göbələklərin inkişafını inhibə edir),
- qidalı maddələrə görə patogen bakteriyalarla rəqabət aparmaqla,
- enterosit reseptorlar ilə birləşmə yolu ilə, bununla da digər potensial patogen mikroorqanizmlərin kolonizasiyasının qarşısını alır.

Bakterial ştammlar həmçinin peristaltikanı stimule edir, bağırsağın keçiriciliyini və seliyn sekresiyasını yaxşılaşdırır. Onlar həmçinin spesifik və qeyri-spesifik immun sistemi stimule edir.

Bağırsağ mikroflorasının balansının pozulması bir sıra amillər nəticəsində yarana bilər (virus və bakterial bağırsağ infeksiyaları, geniş spektrli antibiotiklər ilə və kimyapreparatlar ilə müalicə, qarın

və kiçik çanaq orqanlarının şüa terapiyası, xaricə səyahət nəticəsində) və ya erkən yaşlı uşaqlarda normal bağırsağın mikroflorası vaxtında bərpa olunmadıqda köp, ishal və qəbizlik kimi mədə-bağırsağ pozulmaları yarana bilər.

*Lactobacillus acidophilus* u *Bifidobacterium animalis subsp. lactis* təyin olunması normal bağırsağ mikroflorasının pozulması səbəbindən yüngül və orta mədə-bağırsağ pozulmalarının (xüsusən diareyanın) tezliyini və ağırlığını azaldır və bağırsağın normal peristaltikasını dəstəkləyir, ümumi *Helicobacter pylori* infeksiyasının eradikasion terapiyasının effektivini yaxşılaşdırır.

#### **Farmakokinetikası**

*Lactobacillus acidophilus* u *Bifidobacterium animalis subsp. lactis* ştammları daxil olan probiotik bakteriyalar mədə-bağırsağ traktında yerli təsir göstərir. Daxilə təyin olunduqdan sonra sistem absorbsiyası olmadığı üçün klassik farmakokinetik tədqiqatlar aparılmamışdır. *Lactobacillus acidophilus* u *Bifidobacterium animalis subsp. lactis* mədə turşusuna və ödə davamlı olması onların mədədən və onikibarmaq bağırsağdan keçən zaman yüksək faizlə diri qalmasına imkan verir. Hər iki ştammbağırsağın selikli qişasına persistə edə bilər. Digər orqanizmlər kimi peristaltika və defekasiya vasitəsilə mədə-bağırsağ traktından tədricən eliminasiya olunur.

#### **Klinikayaqədər təhlükəsizlik məlumatları**

Klinikayaqədərki məlumatlara əsasən insanlar üzərində aparılan farmakoloji təhlükəsizlik tədqiqatları zamanı təkrar dozaların toksiklik, genotoksiklik və karsinogenlik potensialı aşkar olunmamışdır. LA-5 və BB-12 reproduktivliyə təsirini göstərən heç bir məlumat əldə olunmamışdır.

#### **Uyğunsuzluq**

Məlum deyil

#### **İstifadəsinə göstərişlər**

Lineks Fortenin tərkibində iki növ probiotik bakteriya ştammi var ki, bunlar da bağırsağ mikroflorasının funksiyasını və balansını yaratmağa və dəstəkləməyə imkan yaradır.

Lineks Forte böyüklərdə, yeniyetmələrdə və uşaqlarda aşağıdakı səbəblərdən yaranan diareyanın, qarında köp və digər mədə-bağırsağ pozulmalarının profilaktikası üçün və dəstəkləyici müalicəsi qismində istifadə olunur:

- uşaqlarda və böyüklərdə mədə-bağırsağ traktının virus və bakterial infeksiyaları (rotavirus infeksiyası, səyahətçi diareyası kimi),
- mikrobəleyhinə vasitələrlə müalicə (antibiotiklər və digər sintetik mikrobəleyhinə vasitələr),
- qarın və çanaq orqanlarının şüa terapiyası.

#### **Əks göstərişlər**

- Təsiredici maddəyə və ya köməkçi maddələrdən hər hansı birinə qarşı hiperhəssaslıq.
- Mədə-bağırsağ traktının obstruksiyası.
- Mədə-bağırsağ traktının perforasiyası və perforasiya riski.

#### **Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri**

Aşağıdakı hallarda istifadəsindən əvvəl xəstələr həkimlə məsləhətləşməlidir:

- bədən temperaturu 38°C-dən yüksək olduqda,
- nəcisdə qan qalığı və ya selik aşkar olunduqda,
- diareya iki gündən artıq davam etdikdə,
- dehidratasiya və bədən çəkisinin itirilməsi ilə müşaiət olunan kəskin diareya olduqda,
- diareya qarında kəskin ağrı ilə müşaiət olunduqda,
- xəstədə xroniki xəstəliklər olduqda (məs., diabet, ürək-damar xəstəlikləri) və ya immun sistemin rezistentliyinin azalması ilə xarakterizə olunan vəziyyətlərdə (məs., İİV infeksiyası).
- qısa bağırsağ sindromu olduqda
- xəstədə naməlum səbəbdən qarında ağrı olduqda.

#### **Diareya**

Diareyanın özbaşına müalicəsi zamanı birinci və əsas tədbir itirilmiş maye və elektrolitlərin bərpası təşkil edir.

#### **Qəbizlik problemləri**

Qəbizlikdən əziyyət çəkən xəstələrə həmçinin sağlam və balanslaşdırılmış qida qəbul etmələri, kifayət miqdarda lifli qidalar və maye qəbul etmələri, fiziki cəhətdən fəal olmaları və hər gün eyni vaxtda defekasiya etmələri məsləhət görülür.

#### *Pediatrik populyasiya*

6 yaşdan kiçik uşaqlarda diareyanın müalicəsi tibbi müşahidə altında aparılmalıdır.

1 yaşdan kiçik uşaqlara Lineks Forte kapsullarının qəbulu məsləhət görülmür. Bu yaş qrupu üçün preparatın daha uyğun buraxılış formasından istifadə edilməsi tövsiyə olunur.

#### *Köməkçi maddələrlə əlaqədar xüsusi xəbərdarlıq*

Lineks Fortenin tərkibində qlükoza, fruktoza və saxaroza var. Fruktozaya qarşı dözümsüzlük, qlükoza/qalaktoza malabsorbsiyası və ya saxaroza-izomaltaza çatışmazlığı kimi nadir irsi xəstəlikləri olan xəstələr bu dərman vasitəsini qəbul etməməlidir.

Lineks Fortenin tərkibində süd proteinlərinin qalıqları ola bilər ki, bu da allergik reaksiyalara səbəb ola bilər.

### **Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri**

Digər bakteriyalar kimi probiotik bakteriya həmçinin müəyyən antibiotiklərə qarşı həssasdır. Bu səbəbdən antibiotikin təyin olunmasından ən azı 3 saat sonra Lineks Forte qəbul edilməsi tövsiyə olunur.

### **Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi**

Hamiləlik və laktasiya dövründə Lineks Forte təyin olunan zaman heç bir arzuolunmaz təsir barədə məlumat verilməyib.

Buna baxmayaraq, bədənə maye və elektrolitlərin itkisinin və ya dölü və ya hamilə qadını risk altına salan digər əlavə təsirlərin yaranmasının qarşısını almaq məqsədilə hamiləlik və laktasiya dövründə kəskin diareyanın müalicəsi zamanı xüsusi ehtiyatlılıq tələb olunur.

Hamiləlik və laktasiya zamanı diareyanın müalicəsi həkim nəzarəti altında aparılmalıdır.

Fertilliyə dair məlumatlar əldə olunmamışdır.

### **Nəqliyyat vasitələrini və digər təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri**

Dərman vasitəsinin sürücülük və digər təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə əlavə təsiri müşahidə olunmayıb.

### **İstifadə qaydası və dozası**

#### *Dozalanması*

*Diareya, köp və digər həzm pozulmalarının qarşısının alınması və dəstəkləyici müalicəsi üçün:*

*Böyüklər və 12 yaşdan yuxarı yeniyetmələr:* 1 kapsul gündə 1-3 dəfəyə qədər (vəziyyətin ağırlığından asılı olaraq), yaxşı olar ki, yemək zamanı.

*2-12 yaş uşaqlar:* 1 kapsul gündə 1-2 dəfə (vəziyyətin ağırlığından asılı olaraq, yaxşı olar ki, yemək zamanı).

*1-2 yaş uşaqlar:* 1 kapsul gündə bir dəfə.

Lineks Forte simptomlar yaxşılaşana qədər qəbul etmək olar. Əgər diareya iki gündən artıq davam edərsə və ya yaxşılaşma baş verməsə, xəstə həkimə müraciət etməlidir.

6 yaşdan kiçik uşaqlarda diareya tibbi müşahidə altında müalicə olunmalıdır.

1 yaşdan kiçik uşaqlara Lineks Forte kapsullarının qəbulu məsləhət görülmür. Bu yaş qrupu üçün preparatın daha uyğun buraxılış formasından istifadə edilməsi tövsiyə olunur.

Diareyanın özbaşına müalicəsi zamanı birinci və əsas tədbir itirilmiş maye və elektrolitlərin bərpası təşkil edir.

#### *İstifadə qaydası*

Dərman vasitəsinin maksimal effektivliyini əldə etmək üçün Lineks Forte kapsullarını yemək zamanı qəbul edilməsi tövsiyə olunur.

Lineks Forteni antibiotik təyin olunmasından ən az 3 saat sonra qəbul edilməsi tövsiyyə olunur.

Lineks Forte kapsullarını alkoqol və ya isti içkilərlə birlikdə qəbul etmək olmaz.

Kapsulu uda bilməyən xəstələr, onun kapsul örtüyünü açıb, içindəkini qaşığa boşaldıb bir miqdar maye ilə qarışdıraraq qəbul edə bilər.

**Əlavə təsirləri**

Probiotik bakteriya istifadəsi ilə əlaqədar yaranan əlavə təsirlər çox nadir hallarda (<1/10,000) rast gəlməmişdir. Hiperhəssaslıq reaksiyası yarana bilər.

**Doza həddinin aşılması**

Doza həddinin aşılması barədə məlumat verilməmişdir.

**Buraxılış forması**

7 kapsul Alüminium/Alüminium blisterdə. 1, 2 və ya 4 blister içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Qablaşdırma ölçülərinin hamısı satışda olmaya bilər.

**Saxlanma şəraiti**

25°C-dən yüksək olmayan temperaturda və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır. Rütubətdən qorunması üçün orijinal qablaşdırmada saxlamaq lazımdır.

**Yararlılıq müddəti**

3 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

**Aptekdən buraxılma şərti**

Resepsiz buraxılır.

**İstehsalçı**

Lek Farmasyutikals d.d., Verovškova 57, 1526 Lyublyana, Sloveniya.

Lek Farmasyutikals d.d., Kolodrovska 27,1234 Mengeş, Sloveniya.

**Qeydiyyat vəsiqəsinin sahibi**

Lek Farmasyutikals d.d., Verovškova 57, 1526 Lyublyana, Sloveniya.